

盛り上がったホクロ・イボに 炭酸ガスレーザーによる除去のご案内


上福岡総合病院 形成外科

当院では、盛り上がったほくろやいぼの治療に適している炭酸ガス(CO₂)レーザーを用いた治療を行っております (自費診療)

炭酸ガスレーザーは水分に吸収されやすく、一瞬にして瞬間的に組織を蒸散させます。

このとき、周辺の血管は熱凝固作用で一瞬のうちに固まり、出血はほとんどありません。

組織を切り取ったり、削ったりする目的で様々な部位に用いられます。



このような方にお勧めの治療です

- ・盛り上がったほくろやいぼ、首筋のイボ(アクロコルドン)の除去
- ・老人性イボ(脂漏性角化症)の除去

ホクロもしくはイボの状態を診察してから、炭酸ガスレーザーの適応であるかを判断します。

ご不安な点を解消し、十分にご納得していただいてから、施術を受けていただきます。照射部位は、赤みや色素沈着を必ずきたし、消退するまでには数ヶ月を要することもあります。

また、照射部位が目立つ傷跡(瘢痕)となることもあり、大きなホクロの場合は手術になることがあります。

炭酸ガスレーザー照射部位は、施術後十分なUVケアが必要になります。

UVケアに関する化粧品も販売しています。

注意

- * すべて自費診療となります
- * 適応とならない種類のイボもございます
- * 老人性色素斑(褐色のシミ)やソバカス、刺青(いれずみ)、先天性のアザに對しては適応になりません
- * 悪性腫瘍の可能性が疑われるホクロ・イボに対しては、炭酸ガスレーザーによる焼却は不適切です。

このような場合は手術で切除し病理組織検査を受けることをお勧めいたします。
(こちらは一般には保険適応)

症 例 (個人差があります)

手術前

手術後(数ヵ月)

ホクロ



イボ(盛り上がったもの)



料金表

初診 2,000円

- | | |
|----------------------------------|---------|
| ・ホクロ・イボ取りレーザー(CO2レーザー) 1mm未満 | 3,000円 |
| ・ホクロ・イボ取りレーザー(CO2レーザー) 1mm～3mm未満 | 5,000円 |
| ・アクロコルドン取りレーザー 10個まで | 10,000円 |
| ・アクロコルドン取りレーザー 11個以上は1個につき | 500円 |

担当医紹介

呉屋 圭一

形成外科常勤医師

ご希望の方は形成外科へお声掛けください。

お気軽にご相談ください。